



PENSE -BÊTE

pour un suivi optimal
de la reproduction du troupeau...



1 PROGRAMME LUMINEUX

Début _____ Compter 90 jours minimum de lumière

Fin _____ Ecarter les boucs des chèvres et les mettre en jours courts dans une pièce sombre pour assurer un effet bouc 45 jours après.

Implant de mélatonine _____

Pour simuler les jours courts...
Penser à poser l'implant des boucs une semaine avant celui des chèvres.
Attendre 45 jours minimum depuis le jour de la pose de l'implant pour assurer la reproduction.

2 ACCOUPLEMENTS

Je programme un rendez-vous avec mon inséminateur et/ou mon contrôleur pour définir le tri des femelles, le planning des accouplements, l'agenda de la saison.

Date _____ Prévoir + de femelles?

3 PREPARATIFS

30 jours avant la synchronisation

Traitement vermifuge en fonction de la copro

Type de traitement _____ Date _____

Curage

Date _____

Taille des onglons

Date _____

Supplémentation en vitamines

Début cure _____ / Fin _____

Alimentation

Vérifier l'équilibre azote / énergie et caler la ration pour les 2 mois à venir.

Déflorage des chevrettes

(si synchrones et IA)

Date _____

Echographie des chèvres

Pour détecter les pseudo-gestantes

Date _____

Réalloter Après échographie et avant JO

CONTACTS

4 SYNCHRONISATIONS

| | Date | Heure |
|--|-------|-------|
| J0 <input type="checkbox"/> Pose des éponges | _____ | _____ |
| J9 <input type="checkbox"/> Injections de PMSG et cloprosténol | _____ | _____ |
| J11 <input type="checkbox"/> Retrait des éponges | _____ | _____ |
| J12 <input type="checkbox"/> Passage du bouc | _____ | _____ |

Le bouc, muni de son tablier, sert à détecter les chaleurs dans les 30 heures (au maximum) qui suivent le retrait des éponges.

5 INSEMINATION

| | Date | Heure |
|--|-------|-------|
| J13 L'inséminateur programme sa venue 43 heures (+/- 2 heures) après le retrait des éponges. | _____ | _____ |

Equilibre alimentaire le jour de l'insémination :

Fourrages :

Concentré :

Correcteur :

6 SUIVI REPRO

Introduction du bouc _____
Plus de 21 jours après IA, pour les retours.

Echographies _____

Pour un résultat fiable, de 35 à 60 jours après IA ?

En cas de mauvaise fertilité du lot inséminé (- de 50% des résultats sur échos positifs), je contacte immédiatement mon inséminateur ou mon contrôleur?